



令和4年4月14日

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について

柴田町民の皆さまへ

新型コロナウイルス
ストップ

感染急増中



宮城県におけるクラスターが発生した場所での感染拡大に影響があると推測される事項

- マスクの着用が不完全
- 食事の際マスクを付けずに会話
- マスクを付けずに密になる機会があった

これらが感染拡大の要因。
徹底的に気を付けること！

参考：宮城県ホームページ 記者発表資料 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)患者の発生等について

ゴールデンウィーク前後の移動・会食機会の増加で見込まれる**感染リスクの高まり**に配慮しましょう！

宮城県の新型コロナウイルス感染症「**再拡大防止期間**」が
5月15日まで延長となりました

会食時

- なるべく短時間
- なるべく少人数（4人以下）
- 大声を出さない（**黙食**）




会話の際

- **飲食をするときだけマスクを外す**
- **会話の際にはマスクを必ず着用**



基本的な感染対策の徹底

- 「3密」は避ける
- **換気の徹底（1時間に1回）**
- 手洗い・手指消毒の励行
- 体調が悪い時は人と会うのは避けましょう



早めの追加接種をご検討ください！

3回目接種をした場合のオミクロン株に対する発症予防効果について

国立感染症研究所の報告によると、**3回目接種はワクチン有効率が高まる**ことが示されている。

接種回数	ワクチン有効率(%)
1回接種後 ^{※1}	46
2回接種後0-2ヶ月 ^{※2}	71
2回接種後2-4ヶ月 ^{※2}	54
2回接種後4-6ヶ月 ^{※2}	49
2回接種後6ヶ月以降 ^{※2}	53
3回接種後^{※3}	81

※1:1回目のみ接種した者 ※2:3回接種していない者のみ
※3:接種からの期間を問わない。なお有効率は暫定値

柴田町の追加接種率は

- ・町民（18歳以上）の**41.3%**
（令和4年4月6日時点）
- ・宮城県は**43.5%**

感染拡大防止のため

より多くの方に**早めの追加接種**
のご検討をお願いします